

UNIfears® säilitusainevaba

silmatilgad, lahus, ilma säilitusaineteta

Mis on UNIfears säilitusainevaba ja milleks seda kasutatakse

UNIfears säilitusainevaba on hüpromelloosi ja dekspantenooli sisaldav silmatilgade lahus. Tootel on kaitsev, rakke taastav ja niisutav toime.

Hüpromelloos moodustab silma sarvkesta pinnale ajutise kaitsva kihi, niisutab silmapinda ja kompenseerib vähest pisarateket, pärssides „kuiva silma“ sümptomeid. Lisaks leevendab see väiksemaid mittenakkuslikke silmaärritusi.

Dekspantenool (B-rühma vitamiin) aitab taastada sarvkesta pinna rakke (epiteelisatsioon).

UNIfears säilitusainevaba sobib ideaalselt kontaktläätsede kandjatele ja tundlike silmadega inimestele.

UNIfears säilitusainevaba pakub kauakestvat leevendust järgmistel juhtudel:

- ♦ vähenenud pisarateke;
- ♦ kuiva silma sündroom (*keratoconjunctivitis sicca*);
- ♦ vigastused ja sarvkesta erosioon;
- ♦ väikeste võõrkehade sattumine silma sidekestale;
- ♦ pärast silmaoperatsiooni;
- ♦ sensoorne ebamugavustunne (põletus, sügelus, võõrkehatus), sellised sümptomid võivad olla seotud väliste teguritega (nt õhukonditsioneer, tuul, saastus, suits, tolm);
- ♦ silmade suurenenud pingutus (pikaajaline töö arvuti taga) ja nägemisraskused päeva jooksul;
- ♦ kontaktläätsede kandmine.

Toodet UNIfears säilitusainevaba tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.

2. Mida on tarvis teada enne toote UNIfears säilitusainevaba kasutamist

Ärge kasutage toodet UNIfears säilitusainevaba:

- ♦ kui olete käesoleva preparaadi mõne koostisaine suhtes allergiline;
- ♦ silma söövituse ägedas faasis, kuni söövitav aine sidekestalt ja surnud kude on täielikult eemaldatud;
- ♦ samaaegselt metallisooli sisaldavate silmapreparaatidega.

Kui kasutate muid silmatooteid, arutage nende kooskasutuse sobivust silmaarstiga. Üldiselt on soovitatav iga preparaadi kasutamise järel oodata vähemalt 5 minutit enne uue kasutamist.

3. Kuidas toodet UNIfears säilitusainevaba kasutatakse

Soovituslik annus on üks tilk päevas kummassegi silma 2–3 korda päevas.

Vajaduse korral võib tilgutada ka ühe tilga iga tunni järel.

Kontaktläätsede kandjad

UNIfears säilitusainevaba tohib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist

Enne esimest kasutuskorda on soovitatav tilgutada esimene tilk mujale kui silma, pigistades õrnalt pudelit, sest tugeva ja ebakorrapärase pigistamise korral võib lahus tulla välja suures koguses.

Laske õhk plastpudelisse tagasi, nii et pudel saab tagasi oma esialgse kuju, ning jätkake tilgutamist silma vastavalt ettekirjutusele.



1. Võtke dosaatoriga plastpudel pakendist välja.



2. Enne esimest kasutamist eemaldage dosaatori korgilt turvariba.



3. Eemaldage dosaatori kaitsekork.



4. Kallutage pea taha, pöörake pudel ümber, tõmmake nime-tissõrmega ettevaatlikult alumine silmalaug eemale, tilgutage silma vajalik arv tilku ning sulgege aeglaselt silm, nii et **UNIfears säilitusainevaba jaotuks ühtlaselt silma pinnale.**

Dosaatori otsik ei tohiks preparaadi manustamise ajal puutuda kokku silma ega silmalauga. Pärast preparaadi silma tilgutamist on vaja kaitsekork pudelile kindlalt tagasi panna, et hoida ära dosaatori otsiku võimalikku saastamist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Harva võib kohe pärast manustamist tekkida kerge, lühiajaline põletustunne või allergiline reaktsioon mõnele preparaadi koostisainele, samuti võivad ripsmed ajutiselt kokku kleepuda.

Kui tekib mõni loetletud sümptom või ebatavaline reaktsioon, võtke ühendust arsi või apteekriga.

5. UNIfears säilitusainevaba koostis

Hüpromelloos 5 mg 1 ml kohta, dekspantenool, naatriumkloriid, dinaatriumedetaat, süstevesi.

6. Kuidas toodet UNIfears säilitusainevaba säilitatakse ning muu teave

Säilitage pudelit originaalpakendis 25°C juures.

Ärge külmutage.

Hoidke preparaat laste eest kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage preparaati pärast kolbampullile või pappkarbile liivakella ikooni kõrvale märgitud kehtivusaaja möödumist. Kehtivusaeg tähistab märgitud kuu viimast päeva.

Ärge kasutage toodet UNIfears säilitusainevaba kauem kui 3 kuud pärast pudeli esmakordset avamist.

Pakendi suurus: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovakkia Vabariik

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-post: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Kasutusjuhendit uuendati viimati detsembris 2014.